

**ВТО****MADE IN GERMANY****Lebosol** **Продуктова информация**

Lebosol[®] - АМИНОЗОЛ[®]

**Органичен НК-тор, течен; при употребата на животински субпродукти от материал.
Категория 3 съгласно Регламент (ЕО) 1069/2009, хидролизирани протеини**

Хранителни вещества: 9,4 % общ азот (N) 115 г/л, 1,1 % общ калиев оксид (K₂O) 15 г/л
Допълнително се съдържат: 0,25 % обща сяра (S) (от които водоразтворима 0,23 %);
1,28 % общ натрий (Na) (от които водоразтворим 1,26 %); 66,3 % органична субстанция

Растенията, които са недостатъчно снабдени с хранителни вещества са повече предразположени към болести. Листното торене осигурява ефективно и бързо снабдяване с хранителни вещества.

Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	Повече жизненост (напр. при мраз по време на цъфтеж)	1 - 2 пъти 0,2 л/дка (най-добре в комбинация с 0,1 л/дка Lebosol [®] -Робустус)	При необходимост
При всички култури	Устойчивост на стрес, добив, възстановяване, воден баланс, коренообразуване, подобрен прием на хранителни вещества, намалява стреса от слънчева радиация (антиоксидант)	1 - 4 пъти 0,2 - 0,3л/дка (При приложение с ръчна пръскачка (0,3 - 0,5 %-ен разтвор).	При стрес

Лебозол[®]България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
При всички култури	Третиране на семената с хранителни вещества за по-добро начално развитие	1 - 4 л/т семена	При третиране на семената
При всички култури	Устойчивост на стрес, добив, възстановяване, воден баланс, коренообразуване, подобрен прием на хранителни вещества, намалява стреса от слънчева радиация (антиоксидант)	Фертигация	Попитайте Вашия професионален консултант!
Картофи	По-бързо възстановяване на листата след сваляне на фолиото при ранни картофи	0,2 - 0,3 л/дка	След сваляне на фолиото
Ягоди	Качествени растения в разсадника: образуване на ластуни, по-силни растения	2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка	14 и 7 дни преди изваждане на разсада
При всички култури	Начално развитие, прираст, коренообразуване	Потапяне на разсада в 1%-ен разтвор, алтернативно пръскане с 0,5 - 1 л/дка	7 - 10 дни след засаждане
Ягоди	Завръз, качество	2 - 3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка	От начало на цъфтеж през интервал от 8 дни
Семкови	Намаляване на ръждата, завръз, големина и оцветяване на плода	2 пъти 0,5 - 0,75 л/дка	При ябълки: червена пъпка и балон; круши преди и след цъфтеж
Костилкови	Завръз, нарастване на плода, по-малко шарка	3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка	при необходимост



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Житни култури	начално развитие, добив, жизненост	0,200 - 0,300 л/дка	След цъфтеж през интервал от 8 дни
Костилкови	Срещу симптоми на шарка по листата и плода	3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка (без ПРЗ)	След цъфтеж през интервал от 30 дни
Храстовидни	Завръз, качество	2 - 3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка	От начало на цъфтеж през интервал от 8 дни
Десертно грозде	Равномерно развитие, завръз, равномерна зрялост	4 пъти 0,3 - 0,5 л/дка	След разлистване, при масов цъфтеж, след цъфтеж, затваряне на чепка
Цитруси	Завръз, качество	2 - 3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка	От начало на цъфтеж през интервал от 8 дни
Орехи	Завръз, качество	2 - 3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка	От начало на цъфтеж през интервал от 8 дни
Винено грозде	Равномерно развитие, завръз, равномерна зрялост	4 пъти 0,3 - 0,5 л/дка	След разлистване, примасов цъфтеж, след цъфтеж, затваряне на чепка
Зеленчуци	Начално развитие, прираст, коренообразуване, срещу образуване на петна при пръскане	0,5 - 1 л/дка (или потапяне на разсада в 1 %-ен разтвор или поливка с 0,5 %)	7 - 10 дни след разсаждане
Хмел	Начално развитие, добив, жизненост, коренообразуване	1 - 3 пъти 0,2 - 0,3 л/дка	От височина 0,5 м
Тютюн	Начално развитие, прираст, коренообразуване	0,5 - 1 л/дка (или потапяне на разсада в 1 %-ен разтвор или поливка с 0,5 %)	7 - 10 дни след разсаждане

Лебозол® България ООД

ул. Метро 5 • 5800 Плевен

телефон: 064 988 041

info@lebosol.bg • www.lebosol.bg

sustainable plant nutrition



Култура	Цел/Проблем	Препоръка	Момент на приложение
Коледни дръвчета	Прираст, леторасти, коренообразуване	потапяне на изходния материал в 1 %-ен разтвор, алтернативно поливка с 1 %-ен	При необходимост
Декоративни растения	Качествени листа и цветове, жизненост, срещу образуване на петна при пръскане	1 - 4 пъти 10 - 30 мл (на 10 л вода или 0,2 - 0,3 л/дка)	При достатъчно развита листна маса
Памук	Завръз, качество	2 - 3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка	От начало на цъфтеж през интервал от 8 дни

