

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА И ЛИСТОВКАТА!

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда спазвайте инструкциите за употреба!

Забранява се повторната употреба на опаковката!

СКОР 250 ЕК

ФУНГИЦИД

Продукт от паралелна търговия



Опасно

Ufi code: MWC2-30Y9-J00X-M5K5

Разрешен за паралелна търговия в Р. България със Заповед № РД 11-1881/08.08.2023г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и Разрешение № 02095-ПРЗ-1/24.08.2023 г. за пускане на пазара и употреба на ПРЗ.

Притежател на разрешението за паралелна търговия: Агропал ООД, гр. София 1806, кв. Горни Богров, ул. Хан Богров №22, тел.: 02/944 62 50

Лице, което пуска на пазара и преопакова: Агропал ООД, гр. София 1806, кв. Горни Богров, ул. Хан Богров №22, тел.: 02/944 62 50

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: дифеноконазол* (difenoconazole) - 250 г/л

* (1-[2-[4-(4-хлорофенокси)-2-хлорофенил-(4-метил-1,3-диоксалан-2-ил)-метил]]-1Н 1,2,4-триазол

Произход: Белгия

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална

ФОРМУЛАЦИЯ: емулсионен концентрат (ЕК)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H304 Може да причини фатални последици при поглъщане и попадане в дихателните пътища.

H319 Причинява сериозно дразнене на очите.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P102 Да се пази далеч от деца.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в центъра по отравяния или на медицинско лице.

P331 Да не се предизвиква повръщане.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P391 Да се събират разпилените материали.

P501 Да се обезопаси съдържанието или опаковката в одобрени за целта предприятия.

EUN066 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,, спазвайте инструкциите за употреба.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът , близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяването на отточни канали на ферми и пътища.)

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 3 метра буферна зона за ягоди и къпини, 25 метра буферна зона за костилкови/семкови култури (ранно приложение), 15 метра буферна зона за костилкови/семкови култури (късно приложение), 3 метра буферна зона с включени 75% дюзи намаляващи отвяването за кореноплодни зеленчуци (без картофи), 5 метра буферна зона с включени 50% дюзи намаляващи отвяването за картофи, 3 метра буферна зона с включени 50% дюзи намаляващи отвяването за листни зеленчуци, 20 метра буферна зона за маслини, 10 метра буферна зона за лозя до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

Опасни компоненти в състава на продукта: разтворител нафта (петрол), високо ароматен

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ: Скор 250 ЕК се приема от растението и действа на гъбния патоген при проникването и формирането на хаусториите. Спира развитието на гъбите чрез прекъсване на биосинтезата на ергостерола в клетъчните мембрани. Въпреки че начинът на действие позволява предпазна или лечебна употреба, препоръчва се препаратът да се прилага достатъчно рано, за да се избегнат на необратимите щети по реколтата и развитие на болестта.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Култура	Болест	Доза на приложение	Фаза на приложение	Макс. брой приложения	Интервал на приложение	Работен разтвор	Карантинен срок
Ябълки*	Струпявяне, Брашнеста мана	0,015-0,02% (15-20 мл продукт/дка при 100л работен разтвор)	ВВСН 61-84 (начало на цъфтеж, около 10% от цветовете отворени; до начало на узряване: поява на специфичното за сорта оцветяване)	3	10	100-150	14
Круши*	Струпявяне	0,015-0,02% (15-20 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 61-84 (начало на цъфтеж, около 10% от цветовете отворени; до начало на узряване: поява на специфичното за сорта оцветяване)	3	10	100-150	14
Кайсии*	Къдравост, Брашнеста мана, Кафяво гниене	0,02-0,03% (20-30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 60 (първи отворени цветове до 7 дни преди прибиране на реколтата при спазване на карантинния срок)	2	7	100-150	7
Праскови*, Нектарни*	Къдравост, Брашнеста мана, Кафяво гниене	0,02-0,03% (20-30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 60 (първи отворени цветове до прибиране на реколтата при спазване на карантинния срок)	2	7-14	100-150	7
Череша*	Бяла ръжда	0,03% (30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 71-77 от (разрастване на яйчника, окапване на завръзи след цъфтежа, плодовете са	3	8-10	100-150	7

			достигнали около 70% от окончателната си големина)				
Череша*, Сливи*	Къдравост, Брашнеста мана, Кафяво гниене	0,02-0,03% (30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 60-87 (първи отворени цветове – беритбена зрялост)	3	10	100-150	7
Домати – полски (П) и оранжерийн и (О)	Кафяви петна (алтернариоза), Брашнеста мана, Листна плесен	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 20-87 (10 или повече листа на главното стъбло - 70% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	3	7	50-100	П-7 О-3
Захарно цвекло	Церкоспороза, Брашнеста мана	0.03% (30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 31-49 (листата покриват 10% от повърхността - кореноплодите са в техническа зрялост)	3	21	50-100	21
Картофи	Кафяви петна (алтернариоза)	0.06% (60 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40-85 (начало на образуване на клубени -плодовете от 1-во плодообразуване са оцветени от охра до кафяво)	3	7	50-100	3
Маслини	Листни петна	40-50 мл/дка	ВВСН 75-85 (размер на плода около 50% от типичния за сорта - увеличаване на специфичното за сорта оцветяване)	2	14	80	30
Лозя (винени и десертни сортове)	Брашнеста мана, Черно гниене	0.012-0,02% (12-20 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 12-85 (вторите листа са отворени - омекване на зърната)	4	10	100	21
Ягоди - оранжерийн и	Брашнеста мана	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 65-89 (пълен цъфтеж: отворени вторични и третични цветове-втора реколта: повечето плодове са оцветени)	3	7	50-100	3
Ягоди* полско	Брашнеста мана	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 51-89 (поява на съцветия - втора реколта: повечето плодове са оцветени)	2	7	50-100	3
Краставици, тиквички, пъпеши, дини - полско	Брашнеста мана	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 51-86 (поява на 1-ви цвят на главното стъбло-60% от плодовете са с типичен цвят на зреене)	3	8	50-100	3
Краставици, тиквички, пъпеши, дини - оранжерийни	Брашнеста мана	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 21-89 (поява на 1-во странично разклонение - пълна зрялост: плодовете са с типичен цвят за зрялост)	3	8	50-100	3
Патладжан* полско и оранжерийно	Кафяви петна (алтернариоза), Брашнеста мана	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 20-87 (10или повече листа на главното стъбло – 70% от плодовете с типичен цвят на зреене)	2	10	50-100	Полско - 3 Оранжерийно - 7

Пипер оранжерийно	Кафяви петна (алтернариоза), Брашнеста мана	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 20-87 (10 или повече листа на главното стъбло – 70% от плодовете с типичен цвят на зреене)	2	10	50-100	3
Целина оранжерийно	Листен пригор (септориоза)	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40-49 (начало на формирание на главите- край на нарастване на корена	2	14	50-100	14
Главесто зеле, Карфиол	Алтернариоза	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40-46 (начало на формирание на главите – 60% от очаквания размер на главите е достигнат)	3	10	50-100	21 – главесто зеле 14 – карфиол
Минимални употреби							
Мушмули, дюли	Струпяване	0,015-0,03% (15-30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 61-84 (начало на цъфтеж: около 10% от цветовете са отворени – начало на узряване)	3	10	100-150	14
Малини, къпини - оранжерийн о	Брашнеста мана, Антракноза, Дидимела, Ръжда	0,03-0,04% (30-40 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 31-49 (леторастите достигат 10% от окончателната си дължина (25 см) – видими първи цветни пъпки)	2	7	50-100	7
Брюкселско зеле	Кафяви петна (алтернариоза), Брашнеста мана, Сухо стъблено гниене, Пръстеновидни петна	0,05% (50 мл/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40-46 (начало на формирането на главите-60% от очаквания размер на главата е достигнат)	2	14	50-100	21
Броколи – полско	Алтернариоза Брашнеста мана Аскохитоза	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40-46 (главите на броколи започват формирание; ширина на нарастващия връх > 1см-60% от очаквания диаметър е достигнат)	3	10	50-100	14
Артишок – полско	Алтернариоза, Брашнеста мана, Аскохитоза	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40-46 (образувана от 10% до 60% от листната маса, характерна за вариетета)	3	7	50-100	14
Грах	Аскохитоза Пръстеновидни петна	0,04% (40 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 51-79 (първите цветни пъпки се виждат извън листата- шушулките са достигнали типичен размер)	2	10	40-50	7
Зелен фасул, грах с шушулки*	Аскохитоза, Пръстеновидни петна	0,04% (40 мл продукт /дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 51-79 (първите цветни пъпки се виждат извън листата- шушулките са достигнали типичен размер)	2	10	40-50	7
Магданоз - полско	Алтернариоза Брашнеста мана Септориоза	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40 (корените започват да нарастват (диаметър>0,5 см)	2	14	50-100	14

Магданоз - оранжерийн о	Алтернариоза Брашнеста мана Септориоза	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40 (корените започват да нарастват (диаметър>0,5 см)	3	14	50-100	14
Кромид лук, чеснов лук - полско	Алтернариоза Ръжда	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40-49 (основите на листата започват да се удебеляват или дължават - листата са загинали)	2	12	50-100	14
Праз лук	Алтернариоза, Ръжда	0,05% (50 мл/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40-49 (основите на листата започват да се удебеляват или дължават- листата са загинали)	3	12	50-100	21
Аспержи - полско	Ръжда по лук, Стемфилиум	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 41-89	3	14	50-100	-
Целина - полско	Септориоза	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40-49 (корените започват да нарастват - листата са загинали)	3	14	50-100	14
Сладки картофи (батати)	Алтернариоза	0,06% (60 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40-85 (корените започват да нарастват – 50% от плодовете узрели или 50% от семената са с типичен цвят, сухи и твърди)	3	7	50-100	3
Захарно цвекло	Рамулариоза Ръжда	0,03% (30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 31-49 (листата покриват 10% от повърхността – кореноплодите са в техническа зрялост)	3	21	50-100	21
Червено и други видове цвекло	Рамулариоза Брашнеста мана Церкоспороза	0,03% (30 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 31-49 (листата покриват 10% от повърхността – кореноплодите са в техническа зрялост)	3	21	50-100	21
Бобови култури (фасул, леща, нахут, лупина)	Аскохитоза	0,04% (40 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 51-79 (първите цветни пъпки се виждат – чушките: отделни фасулеви зърна се виждат лесно)	2	21	40-50	28
Главесто зеле, Карфиол	Аскохитоза	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40-46 (начало на формиране на главите – 60% от очаквания размер на главата достигнат)	3	10	50-100	21 – главесто зеле 14 за карфиол
Декоративни растения и цветя	Листни петна, (алтернариоза) Кафяви листни петна, (церкоспороза), Антракиоза, Брашнеста мана, Ръжди, Кафяви петна по далия, Рамулариоза, Септориоза,	0,05% (50 мл продукт/дка при 100 л работен разтвор)	ВВСН 40-89	3	14	50-100	-

	Стемфилиум						
--	------------	--	--	--	--	--	--

*Да се спазва Закона за пчеларството!

Поносимост от културите: Ако се спазват препоръчаните дози за приложение, Скор 250 ЕК се понася добре от всички култури.

ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ: Приготвяне на разтвора: Напълнете резервоара с половината от необходимото количество вода и включете уреда за разбъркване. Прибавете необходимото количество от продукта и продължете разбъркването, докато доливате останалото количество вода и по време на пръскането. Количество работен разтвор на декар: Количеството разтвор на декар варира, като зависи от използваната техника за третиране, употребата на прилепители и др. Използвайте такова количество работен разтвор, което да осигури оптимално покритие на растенията, без стичане или допускане на зони без пълно покриване.

УСЛОВИЯ НА БЕЗОПАСНОСТ: Съхранявайте препарата заключен, извън достъпа на деца, други неоторизирани лица и животни.

Безопасност на работника: ИЗБЯГВАЙТЕ попадане на концентрат или резервоарна смес в очите, по кожата или върху дрехите. НЕ вдишвайте изпарения или мъгла от продукта. НЕ яжте, не пийте и не пушете по време на работа с продукта, измийте лицето и ръцете си преди хранене, пиене или пушене. При приготвяне на разтвора и по време на третиране НОСЕТЕ защитно облекло: гумени ръкавици, работен комбинезон, очила или защитна маска на очите/лицето, шапка, стабилни обувки. СЛЕД РАБОТА основно почистете използваната техника за пръскане, измийте цялото си тяло и се преоблечете. Изперете работното облекло преди повторна употреба.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: Няма специфична противоотрова. Прилагайте симптоматична терапия. При съмнение за отравяне незабавно прекратете работа и потърсете лекарска помощ. Покажете етикета на лекаря. При контакт с кожата: съблечете замърсеното облекло и обилно измийте засегнатите части на тялото с чиста вода и сапун. При контакт с очите: промийте обилно с чиста вода в продължение на няколко минути, като държите клепачите отворени. Незабавно потърсете лекарска помощ. При вдишване: ако сте вдишали изпарения, се преместете на чист въздух. Вдишването може да причини оток на белия дроб и пневмония. При поглъщане: потърсете незабавно медицинска помощ. Забележка: Никога не давайте нищо за поглъщане на пострадал в безсъзнание и не предизвиквайте повръщане. В случай на спешност: Клиниката по токсикология към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – тел. 02/9154409, 02/9154233 или на Националния телефон за спешни повиквания 112.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: Продуктът е силно отровен за водни организми. НЕ използвайте току що третираните площи за паша, за събиране на продукти за храна или фураж, дръжте добитъка далече от тях.

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО ИЗЛИВАНЕ НА ПРОДУКТА: Замърсеното място да се измие с вода. Да се избягва вливането на промивните води в повърхностни водоизточници. Адсорбирайте с пясък, почва или друг подходящ адсорбиращ материал, като го съберете в специални, обозначени, плътно затварящи се съдове, след което ги предайте на лице, притежаващо разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците. Да се предотврати отвяване и разпращаване на сухия материал при събирането и изсипването му в контейнери. За разливания на продукта или неконтролирано (аварийно) изпускане да се уведомят съответните отговорни органи.

МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР: Подходящи противопожарни средства са: сух химически пожарогасител, въглероден диоксид или вода чрез разпръскване (да не се използва директна водна струя). Да се използва индивидуален дихателен апарат и защитна екипировка.

ТРАНСПОРТ: Да се спазва Наредбата за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита.

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Складирайте продукта далече от слънчева светлина и влага, на проветриво място, в оригинални, плътно затворени опаковки. Не допускайте складиране при температура под -5°C и над +35°C. Не складирайте опаковките стифирани над 2 м височина, за да избегнете повреди от смачкване.

ПРАЗНИ ОПАКОВКИ: Изпразнете напълно съдържанието от опаковките, след което ги изплакнете трикратно, като добавите разтвора от изплакването към работния разтвор в резервоара. С остатъците от препаратите и опаковките да не се предизвиква замърсяване на повърхностни и подземни води. Да не се допуска изпускане на отпадъците в канализацията. Празните опаковки не трябва да се използват за други цели. Съберете остатъците от препаратите и празните опаковки в специални, обозначени, плътно затварящи се съдове, след което ги предайте на лице, притежаващо разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците.

Код на отпадъците (продукта): 02 01 08* агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества.

Код на отпадъците (опаковките): 15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. Забранява се повторната употреба на опаковката!

ПРАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ: Преди прилагане на продукта прочетете приложената към опаковката инструкция. **Отговорности:** Всички препоръки за употреба на този продукт почиват на настоящото ниво на нашето знание. Тъй като продуктът и неговото действие могат да бъдат повлияни от фактори извън контрола на производителя (вкл. условия на съхранение, неблагоприятни почвени и климатични условия, неправилно приложение на препаратите или устойчивост на неприятелите), производителят отхвърля всички отговорности за загуби или щети в резултат на тези фактори.

Производител: Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария.

Срок на годност: 3 години

След изтичане на срока на годност: След изтичане на означения срок на годност, проверете отново съдържанието а препаратите в ЦЛХИК при БАБХ. При положение, че същият не отговаря на декларирания състав, постъпете съгласно местните разпоредби.

Партиден номер: виж опаковката

Дата на производство: виж опаковката