

ПРОДУКТ ЗА РСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЕТИКЕТА

За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба

Раундъп Класик Про

Продукт от паралелна търговия

Хербицид

Разрешен за паралелна търговия и употреба в Р. България със Заповед № РД 11-234/17.02.2022 г. на изп. директор на Българската агенция по безопасност на храните и Разрешение №02003-1/11.03.2022.

Притежател на разрешението за паралелна търговия: Агропал ООД, гр. София 1806, кв. Горни Богров, ул. Хан Богров №22, тел.02/994 62 50.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Глифозат 360 г/л, наличен като 441 г/л (35.3 % w/w) от калиевата сол на глифозат, CAS № 70901-12-1

ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Разтворим концентрат (SL), съдържащ 360 г/п глифозат плюс 72 г/л сърфактант. Сърфактант CAS № 68478-96-6

ФУНКЦИЯ НА ПРОДУКТА: хербицид

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: непрофесионална



Внимание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

H319 Причинява сериозно дразнене на очите.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли на одобрено място за изгаряне.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.

SPe3 Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до съседни неземеделски земи с цел опазване на нецелевите растения. 5 метра буферна зона не е необходима, когато се използва пръскачка, намаляваща страничното разпръскване на струята с 60%.

Особени и изисквания и/или ограничения:

- Да не се прилага чрез въздушно пръскане.

- При приложение с ръчно оборудване без разреждане на продукта или с количество на работния разтвор до 2 литра на декар, да се носят защитно облекло и ръкавици.
- Срок на повторно влизане на животни в третираните площи - 24 часа.
- Третираната растителност да не се използва за храна на животни.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Култура и/ или ситуация	Вредител или група вредители, с които се води борба	Норма на приложение л/дка	Карантинен срок (дни)	Забележки
Третиране преди сеитба/разсажда при кореноплодни/ грудкови култури (моркови, картофи,захарно цвекло), ягоди, зеленчуци, зърнени култури, царевица, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица	Едногодишни плевели (под 20 см)	0,1-0,4		Приложение с конвенционална наземна техника. Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели. Брой приложения 1-3 Интервал между приложенията (мин): 28 дни 10 - 40 л вода/дка Третиране 2 дни преди сеитба/ разсаждане/ и 6 дни в случай на многогодишни плевели. При зеленчуци в случай на приложение в доза >0,144 кг а.в. /дка - третиране 7 дни преди сеитба.
	Двугодиши плевели	0,4-0,6		
	Многогодиши плевели	0,6-1,0		
Третиране след засяване/ засаждане, предипоникване на културата , при аспержи, зърнени култури, царевица,захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култури, луковици на цветя	Едногодишни двугодишни и многогодишни плевели	0,1-1,0		Приложение с конвенционална наземна техника Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели Брой приложения 1 10 - 40 л вода/дка Прилага се не по-късно от 3 дни след сеитба. При аспержи да се прилага преди поникване на пъпките
Третиране след поникване/ разсаждане на културата , при кореноплодни/грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови зеленчуци (грах, боб, бакла, зелен фасул), листно-стъблени зеленчуци (артишок), соя, царевица, рози	Едногодишни плевели (под 20 см)	0,1-0,4	28	Между-редовете на културата / селективно оборудване*
	Двугодишни плевели	0,4-0,6		Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели Брой приложения 1-3, 2 - при домати, патладжан Интервал между приложенията (мин): 28 дни 20 - 40 л вода/дка * Техника за намазване, навлажняване, пръскачки с протектор за насочено третиране Да се избягва контакт скултурата
	Многогодишни плевели	0,6-1,0		

Третиране след прибиране на реколтата, при кореноплодни и грудкови зеленчукови култури (моркови, картофи, захарно цвекло), зеленчукови култури, ягоди, зърнени култури, слънчоглед, соя, лен, памук, синап, разсадници, синап, маслодайна рапица, стърнища	Едногодишни плевели (под 20 см)	0,1-0,4		Приложение с конвенционална наземна техника Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели Брой приложения 1-3 Интервал между приложенията (мин): 28 дни 10- 40 л вода/дка При стърнища продуктът да се прилага не повече от един път годишно
	Двугодишни плевели	0,4-0,6		
	Многогодишни плевели	0,6-1,0		
Лозя (по-стари от 4 години)	Едногодишни плевели (под 20 см)	0,1-0,4	28	Приземно приложение с конвенционална наземна техника Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели Брой приложения 1-3 20 - 40 л вода/дка Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията
	Двугодишни плевели	0,4 - 0,6		
	Многогодишни плевели	0,6-1,0		
Орех, лешник, бадем	Едногодишни плевели (под 20 см)	0,1-0,4	7	Приземно приложение с конвенционална наземна техника Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели Брой приложения 1-2 20 - 40 л вода/дка; 5 - 40 л вода/дка; 5 - 40 л вода/дка Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. При случайно напръскване при бадем риск от чувствителност, дори и при добре развит ствол
	Двугодишни плевели	0,4 -0,6		
	Многогодишни плевели	0,6-1,0		
Цитрусови култури	Едногодишни плевели (под 20 см)	0,1-0,4	7	Приземно приложение с конвенционална наземна техника Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели Брой приложения 1-5 20 - 40 л вода/дка Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията
	Двугодишни плевели	0,4-0,6		
	Многогодишни плевели	0,6-1,0		
Семкови и костилкови овощни култури	Едногодишни плевели (под 20 см)	0,1-0,4	7	Приземно приложение с конвенционална наземна техника Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели

	Двугодишни плевели	0,4-0,6		Брой приложения 1-3 Интервал между приложенията (мин): 28 дни 8 - 40 л вода/дка Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията
	Многогодишни плевели	0,6-1,0		
Маслини	Едногодишни плевели (под 20 см)	0,1-0,4	7	Приземно приложение с конвенционална наземна техника Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели Брой приложения 1-3 Интервал между приложенията (мин): 28 дни 20 - 40 л вода/дка Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията
	Двугодишни плевели	0,4-0,6		
	Многогодишни плевели	0,6-1,0		
Киви	Едногодишни плевели	0,1-0,4		Приземно приложение с конвенционална наземна техника Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели Брой приложения 1-3 Интервал между приложенията (мин): 28 дни 20 - 40 л вода/дка Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията При случайно напръскване риск от чувствителност дори при добре развит ствол
	Двугодишни плевели	0,4-0,6		
	Многогодишни плевели	0,6-1,0		
Разсаждащи секултури (цветя, храсти, декоративни растения, горска топола)	Едногодишни плевели (под 20 см)	0,1 – 0,4		Приложение с конвенционална наземна техника Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели Брой приложения 1-3 Интервал между приложенията (мин): 28 дни 20 - 40 л вода/дка Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията При случайно напръскване риск от чувствителност дори при добре развит ствол
	Двугодишни плевели	0,4-0,6		
	Многогодишни плевели	0,6-1,0		
Люцерна, ливади	Едногодишни плевели (под 20 см)	0,1-0,4		Приложение със селективно оборудване* Стадий на развитие и сезон: плевелите по високи от

	Двугодишни плевели	0,4-0,6	културата 20 - 40 л вода/дка *Техника за намазване и навлажняване/ пръскачки с протектор за насочено третиране. Да се избягва контакт с културата
	Многогодишни плевели	0,6-1,0	
Пасища, поляни, ливади (обновяване и селективен контрол на инвазивни плевели)	Едногодишни плевели (под 20 см)	0,1-0,4	Приложение с конвенционална наземна техника Стадий на развитие и сезон: преди засяване или след прибиране, съобразно стадия на развитие на плевелите Брой приложения 1-3 Интервал между приложенията (мин): 28 дни 20 - 40 л вода/дка
	Двугодишни плевели	0,4-0,6	
	Многогодишни плевели	0,6-1,0	
Незасети земи Угари	Едногодишни плевели (под 20см)	0,1-0,4	Приложение с конвенционална наземна техника Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели Брой приложения 1-3 Интервал между приложенията (мин): 28 дни 20 - 40 л вода/дка
	Двугодишни плевели	0,4-0,6	
	Многогодишни плевели	0,6-1,0	
Промислени и градски площи, автомагистрала и пътища, ж.п. линии, летищни полоси, тротоари, пешеходни паркови алеи, и други неземеделски площи, отточни и напоителни канали без воден поток	Едногодишни плевели (под 20 см)	0,1-0,4	Приложение с конвенционална наземна техника Стадий на развитие и сезон: поникнали плевели Брой приложения 1-3 Интервал между приложенията (мин): 28 дни 20-40л вода/дка

БЕЛЕЖКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: За да се получат оптимални резултати, когато се използва Раундъп Класик Про, плевелите трябва да имат достатъчна листна повърхност и активно да растат.

ЕДНОГОДИШНИ ЖИТНИ И ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ трябва да имат поне 5 см листа или съответно 2 разлистени същински листа.

МНОГОГОДИШНИ ЖИТНИ трябва да имат напълно поникнал здрав, зелен лист (троскотът, например, става чувствителен в началото на братене и растеж на нови ризоми, което обикновено настъпва, когато растението има 4-5 листа, всяко с 10-15 см нов растеж).

МНОГОГОДИШНИ ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ са най-чувствителни в периода на цъфтеж. В случай на цветни асоциации адаптирайте ефективната доза за борба с най-малко чувствителния вид.

ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ГРИЖИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ПРИ ПРЪСКАНЕ, ТЪЙ КАТО ТОВА МОЖЕ СЕРИОЗНО ДА УВРЕДИ СЪСЕДНИТЕ КУЛТУРИ ИЛИ РАСТЕНИЯ:

Винаги следвайте одобрените дозировката и метода на употреба.

Използвайте 5 до 40 литра вода/дка.

Период от поне 4 часа без дъжд трябва да следва прилагането на Раундъп Класик Про, обаче се препоръчва да не се третира, ако рискът от дъжд е предстоящ.

Не пръскайте при ветровити условия или роса.

Не пръскайте върху плевели, които са естествено застаряващи или където растежът е нарушен от суша, високи температури, покритие от прах, наводняване или замръзване. Непосредствено след прилагане, в противен случай може да се получи слаб резултат.

Третирането следва да се проведе при температури не по-високи от 25 °C.

СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ: На площи, третирани с Раундъп Класик Про, могат да се отглеждат всички видове селскостопански култури. Раундъп Класик Про се инактивира чрез абсорбиране върху глинестите фрагменти и органичното вещество в почвата. Когато се смесва с други препарати за растителна защита, трябва да се вземе предвид по-дългият период на изчакване. Вижте „Бележки и Предупреждения“ за специфични ограничения.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: Хербицидът Раундъп Класик Про е съвременен препарат, съдържащ глифозат като калиева сол. Раундъп Класик Про се поема от листната маса и се пренася към подземните корени, ризоми и ластуни, осигурявайки контрол и на едногодишните и на многогодишните житни и широколистни плевели.

Симптомите на третирането като цяло се виждат след 7-14 дни или повече, ако растежът е бавен след пръскането.

Листни симптоми приемат формата на зачервяване, после пожълтяване на листната маса и първо се наблюдават на тревните плевели, а за да се появят по широколистните плевели се изисква по-дълго време.

Раундъп Класик Про ще остане ефикасен при ниски, но не замразяващи температури, обаче началото на симптомите ще се забави.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОР ЗА ПРЪСКАНЕ: Раундъп Класик Про е водоразтворим концентрат, който може да бъде прилаган в обеми за пръскане в обхвата 5-40 л/дка., използвайки монтирани на трактор или гръбни пръскачки.

Резервоарът на пръскачката се пълни до половината с чиста вода, след това се включва бъркалката и се добавя необходимото количество Раундъп Класик Про. После резервоарът се допълва с вода. По време на пръскането трябва да се поддържа добро разбъркване на сместа за пръскане. Гръбни пръскачки: напълнете наполовина резервоара на пръскачката с чиста вода, добавете точното количество Раундъп Класик Про и долейте с вода. Разбъркайте старателно. НЕ СМЕСВАЙТЕ, СЪХРАНЯВАЙТЕ ИЛИ ПРИЛАГАТЕ РАУНДЪП КЛАСИК ПРО В КОНТЕЙНЕРИ ИЛИ РЕЗЕРВОАРИ ЗА ПРЪСКАНЕ ОТ ГАЛВАНИЗИРАНА ИЛИ НЕПОКРИТА СТОМАНА. НЕ ОСТАВЯЙТЕ смеси за пръскане в резервоар за дълги периоди от време и се уверете, че резервоарите са ДОБРЕ ВЕНТИЛИРАНИ

ОБЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РЕЗИСТЕНТНОСТ: Всяка популация плевели може да съдържа растения, естествено по-толерантни или резистентни към определени хербициди, което може да доведе до незадоволителен контрол при употребата на тези продукти. Глифозат е хербицид Група Г въз основа на класифициране според начина на действие от Международна комисия за действие по въпросите на резистентността към хербициди (HRAC).

Трябва да бъде приета стратегия за забавяне развитието и контролиране на резистентността към хербициди въз основа на местните нужди и интегриран диверсифициран контрол на плевелите. Това включва правилната употреба на хербициди, интегриране на хербициди с различни механизми на действие и/или използване на други културни или механични практики:

- Следвайте препоръките от етикета, за да сте сигурни, че третирането е направено в правилната фаза на растеж на плевелите, при подходящите климатични условия и в правилната доза
 - оптимизирайте използването на набор от инструменти, които са част от нормални практики за контрол на растежа на плевелите при нормален посев или ландшафт.
 - Сведете до минимум на риска от разпространение на плевели. Уверете се, че селскостопанското оборудване е почистено от почва и растителност, когато се движите между полетата.
 - винаги следвайте добрите практики за пръскане, за да се постигне ефективна борба с плевелите:
- 1 пръскащото оборудване трябва да се проверява периодично (например чрезоторизирани специалисти).
 - 2 дозирайте и пръскайте точно - калибрирайте пръскачката и направете точно количество разтвор за площта, която ще се третира.
 - 3 използвайте правилните дюзи за да увеличите покритието на плевелите с минимално отнасяне.
 - 4 пръскайте само при подходящи метеорологични условия.
 - 5 наблюдавайте плевелите след пръскане за да се погрижите за потенциални проблеми при контрола на плевелите контролирайте оцелелите целеви плевели механично или с регистрирани ефективни хербициди, различни от глифозат, преди те да произведат семена.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Да не се яде, пие и пуши, когато се използва. Да се избягва контакт с кожата и очите. ДА СЕ

НОСЯТ ПОДХОДЯЩИ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ, когато се борави с концентрата и когато себорави със замърсени повърхности. ДА СЕ НОСИ ПОДХОДЯЩО ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО (ГАЩЕРИЗОН), ПОДХОДЯЩИ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ И ГУМЕНИ ОБУВКИ, когато се използват ръчни пръскачки и оборудване за чистене на плевели. ДА СЕ ИЗМИЯТ РЪЦЕТЕ И ИЗЛОЖЕНАТА КОЖА преди хранене и пиене и след работа. След употреба работещите трябва да се измият с вода и сапун. Да се изпере защитното облекло и да се почистят всички лични предпазни средства.

Използваното оборудване да се почисти и измие старателно на определените места.

СЪХРАНЕНИЕ: В сухи и добре вентилирани складове за продукти за растителна защита, далеч от храни, напитки и фуражи и торове; Да се държи в оригинална опаковка, плътно затворен, с етикети; Да се държи извън достъпа на деца; Да се избягва замръзване; Не се възпламенява и не причинява корозия на металите.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: В случай на неразположение на работника - незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже етикета;

В случай на контакт с очите - незабавно изплакнете обилно с вода за 15 минути. Контактните лещи (ако има такива) да се отстранят и да се продължи промиването. Ако симптомите продължат, да се консултира с офталмолог;

В случай на контакт с кожата, незабавно да се свали замърсеното облекло, ръчен часовник или бижута и засегнатата кожа да се промие обилно с вода. Да се изперат дрехите и да се почистят обувките преди повторна употреба. Ако има постоянни симптоми, да се потърси лекарски съвет

При вдишване - пострадалият индивид незабавно да се премести на свеж въздух;

При поглъщане - незабавно да се предложи да се изпие вода и незабавно да се потърси медицинска помощ. Никога да не се дава нищо през устата на човек в безсъзнание. Да не се предизвиква повръщане, освен ако не е препоръчано от медицински персонал.

ПОЛЕЗНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЛЕКАРЯ:

Няма специфична противоотрова. Лечението е симптоматично. Лечение на базата на решението на лекаря според симптомите на пациента. Ако е необходимо да се консултира с Центъра по клинична токсикология в София на телефони-02/9154346; 02/9154426 и 02/9154233. Телефон/факс; 02/9154409.

E-mail: poison_center@mail.orbitel.bg, <http://www.pirogov.bg> Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ: При случайно разливане на препарата, посипете с абсорбиращ материал (пясък, дървеснитрици, глина, хидратна вар, бентонит и др.) и не позволявайте почвата да се замърси или попадане в канализационни тръби, отточни канали и други водни потоци. След това съберете сместа от препарат и поглъщащ материал в специален контейнер и потърсете помощта на специалист. **ПРОТИВОПОЖАРНИ**

МЕРКИ: Продуктът не гори. Да се държи далеч от огън и пряка слънчева светлина. За борба с пожар да се използва сух химикал, въглероден диоксид, водна струя, водна мъгла или пяна. Използваното пожарогасително средство не трябва да попада във водни източници, водни басейни и дренажни води. Пожарникарите трябва да носят дихателни апарати и защитно облекло.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРАЗНИ ОПАКОВКИ: Изсипвайте цялото съдържание на опаковката в резервоара на пръскачката; Празната опаковка да се изплакне трикратно с чиста вода и съдържанието също да се излее в резервоара на пръскачката; Уверете се, че празната опаковка няма да бъде използвана чрез рязане или омачкване, а следва да се изхвърли или изгори на посочените за тази цел места, но винаги с прилагане на националните нормативи; Остатъци от препарата и от работния разтвор да не се изхвърлят в обществената канализационна система и във водоеми, а съгласно местните разпоредби. Опаковка: **HDPE**

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОСТАНАЛ ПРОДУКТ: Да - се изхвърля като опасен отпадък. Да се гори в подходящ инсинератор. Изхвърляне като опасен отпадък може да се направи само в одобрен от властта инсинератор за опасни отпадъци.

ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ: Да се прилагат наредбите за транспортиране на опасни химически вещества. Да се прилагат наредбите на Европейското споразумение относно международния сухоземен транспорт на опасни стоки.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: МОНСАНТО Европа С.А./Н.В.

Име на лицето, което пуска продукта на пазара: Агропал ООД, София 1806, кв. Горни Богров,

ул. Хан Богров №22, тел. 02 994 62 50

СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: виж опаковката

ПАРТИДЕН НОМЕР: виж опаковката